



BLOC SD 50

RODONTICIDE SURPUISSANT A BASE DE DIFENACOUM

AMM n° 8900402 par SALOMEZ

CARACTERISTIQUES

Rodenticide présenté en sachets doses sous emballage plastique prêts à l'emploi pour la destruction des rats et des souris.

Adaptable à tous les cas particuliers et n'occasionne aucun des inconvénients des raticides usuels.

Parfaitement adapté pour la lutte contre les rongeurs en milieu humide (égouts, stations d'épuration, bords de fossés ou de rivière, vides sanitaires, caves, etc...).

Ne moisit pas, ne germe pas, ne se désagrège pas. La flottabilité de son emballage s'accommode des changements de niveaux d'eau intempestifs.

N'exhale aucune odeur ; les animaux domestiques ne sont donc pas attirés.

En milieu naturel sa présentation protège les volatiles de l'ingestion.

PROPRIETES PHYSIQUES

- Aspect : sachet de 2 appâts de 30 g.
- Blé concassé amalgamé au suif et paraffine.
- Matière active : difénacoum à 0,005 %.
- DL 50 sur rat : 1,8 mg/kg.
- DL 50 sur porc : > 80 mg/kg.

PRECAUTIONS EVENTUELLES

Nous préconisons le port de gants pour la manipulation des appâts afin de garantir une efficacité optimale du traitement.

En cas d'accident ou malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette : antidote vitamine K1.

Stockage dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

MODE D'EMPLOI

Traitement en milieu humide

Déposer 2 sachets tous les 15 à 20 mètres, repérer l'entrée des galeries et y mettre plusieurs sachets. Autour d'un plan d'eau disposer des sachets tous les 50 m.

Traitement en milieu sec

Mettre 1 sachet tous les 5 mètres le long des murs de préférence sur des points offrant un passage obligé. Les zones présentant des déjections de rongeurs sont à éviter, les rats ne consommant jamais à ces endroits.

Traitement en milieu naturel

Disperser les appâts au voisinage des terriers et des zones de passage.

Durée du traitement

Il est recommandé de commencer le traitement par un apport massif d'appâts puis de réduire peu à peu les doses.

L'effet du difénacoum est cumulatif et les animaux sont éliminés dans un délai de 8 à 10 jours. Ne pas hésiter à laisser des appâts encore les jours suivants.



Consultez nos FDS sur



USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.

Indice 3 / septembre 2012

